Resumen

BLOQUEIOS DO NERVO PECTORAL, FERRAMENTA ESQUECIDA E UTIL NA IMPLANTAÇAO DE MARCAPASSO EM PACIENTES COM ALTO RISCO CARDIOVASCULAR. RELATO DE CASO

Luis Alberto Rodriguez Linares[1]
Pedro Ferro Lima Menezes[1]
Cesar Antonio Tavares da Rocha[1]

[1]Hospital do Servidor Publico Estadual, São Paulo, Brasil. Email: luisro0729@hotmail.com

Resumen

Objetivo: Os bloqueios de nervo periférico são pouco usados em cirurgia cardíaca. Queremos demonstrar a utilidadee vantagens em pacientes de alto risco cardiovascular

Relato de Caso: Paciente masculino de 90 anos, 80 kg, com Bloqueio atrioventricular, pós-infarto agudo do miocárdio. Solicitada troca de marcapasso definitivo. Monitorização básica, cateter nasal com O2. Medicado commidazolan 1 mg, lidocaina60 mg e cetamina 30mg. Feito bloqueio do nervo peitoral esquerdo I e II guiado por ssonografia, injetado 20 ml de ropivacaina a 0.375%,alocados10ml no PEC 1 e 10 ml no PECS 2, sem intercorrências. Sem uso de opioides na internação, dor 12 horas após o procedimento controlada com dipirona.

Discussao: O Bloqueio do nervo peitoral (PEC Block), consegue atingir os nervos peitoral medial e lateral conseguindo analgesia duradoura do dermatomo torácico ipsilateral completo, redução de náusease vômitos. Utilizamos o PEC Blockcomo opção anestésico pensando na pequena repercussão hemodinâmica e analgesia pos operatória.

Conclusoes: Neste caso se evidenciou como o uso adequado de bloqueios do nervo peitoral em paciente com alto risco cardiovascular, diminuiu o desfecho, acelerandoo alta hospitalar e evitou a anestesia geral para esse paciente.

Palavras chave: bloqueiodopeitoral, marcapasso, cardiopata, pecs1, pecs2.