

ANESTESIA REGIONAL PARA RESECCIÓN DE SARCOMA DE CLAVÍCULA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: CASO CLÍNICO

Gabriela López¹

Natalia Solari¹

Alberto Sánchez¹

Clarisa Lauber¹

¹Email: dralopez1@gmail.com

Resumen

Introducción: La cirugía de resección clavicular es un procedimiento de alto impacto doloroso que, al comprometer el confluente cérvico torácico, presenta desafíos anatómicos y técnicos para la realización de un adecuado bloqueo analgésico.

Objetivo: Describir las técnicas de bloqueos regionales en cirugía de resección oncológica completa de clavícula y sus beneficios.

Metodología: Paciente de 10 años 28 Kg portador de sarcoma clavícula izquierda. Recibió radio y quimioterapia. Coordinado para resección completa de clavícula. Se realiza abordaje de plexo braquial por vía interescalénica posterior ecoguiado con colocación de catéter e infusión continua de anestésico local, bloqueo ecoguiado del plexo cervical superficial con dosis única de anestésico local y bloqueo paravertebral ecoguiado a nivel de la segunda vértebra torácica con dosis única, sumado una anestesia intravenosa total en base a propofol, remifentanyl, dexmedetomidina.

Resultado: La anestesia combinada cumplió con los requerimientos quirúrgicos. Se utilizaron objetivos bajos en sitio efecto de propofol, remifentanyl, y dexmedetomidina, lográndose estabilidad hemodinámica, un despertar confortable y sin dolor. Se lograron excelentes condiciones de analgesia en el postoperatorio (escala visual análoga de 0). No requirió rescate con opiáceos durante el mismo.

Conclusiones: La zona clavicular recibe inervación del plexo cervical superficial, del plexo braquial y de la primera y segunda ramificación, requiriendo bloquear todas estas estructuras nerviosas para el correcto control analgésico. El abordaje del plexo braquial interescalénico por vía posterior resulta una técnica adecuada para colocación y fijación de catéter en cirugías del sector anterior de zona clavicular, sin interferir en el sitio quirúrgico.

Palabras clave: encrucijada cérvico torácica. Bloqueos regionales ecoguiados.