

Leiomiosarcoma de vena cava inferior, reconstrucción mediante interposición de prótesis y anticoagulación

Leiomyosarcoma of the inferior vena cava, reconstruction with interposition of prosthesis and anticoagulation

Leiomiossarcoma da veia cava inferior, reconstrução por interposição de prótese e anticoagulação

A. Guillén¹, N. Tarigo², M. Zeoli³, F. Cabo⁴, G. Andreoli⁵, R. Valiñas⁶

RESUMEN

El leiomiosarcoma primario de vena cava es una neoplasia poco frecuente originada a nivel de las células musculares lisas de la túnica media. Representa el 2% de todos los leiomiosarcomas y el 60% de los tumores de vena cava. Presentamos el caso clínico de una paciente de 64 años que consulta por dolor lumbar derecho. La tomografía computada evidencia una gran masa retroperitoneal que engloba la vena cava inferior y contacta con el riñón derecho; el estudio histopatológico de la biopsia certifica un leiomiosarcoma.

Se realiza tratamiento quirúrgico mediante resección tumoral con vena cava inferior e interposición de prótesis sintética y nefrectomía derecha.

El estudio anatomo-patológico de la pieza certifica un leiomiosarcoma de alto grado sin compromiso de la cápsula renal con bordes de resección libres.

La resección radical con márgenes negativos actualmente ofrece la mejor tasa de supervivencia. Aún se encuentra en discusión la indicación de la anticoagulación en pacientes con colocación de prótesis.

Palabras claves: Leiomyosarcoma;
Prótesis e implantes;
Vena cava inferior.

Key words: Leiomyosarcoma;
Prostheses and implants;
Vena Cava, Inferior.

1. Residente de Clínica Quirúrgica F - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
2. Profesor Adjunto Clínica Quirúrgica F - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
3. Asistente de Clínica Quirúrgica F - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
4. Asistente de Catedra de Imagenología - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
5. Profesor Agregado Clínica Quirúrgica F - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.
6. Profesor Director Clínica Quirúrgica F - Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República.

Correspondencia: Dra. Alison Guillén, email: aguillen.med@gmail.com

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para la publicación del caso.

Recibido: 24/11/22

Aprobado: 26/5/23

INTRODUCCIÓN

El leiomiosarcoma de vena cava inferior es una neoplasia rara, poco frecuente, descrito por primera vez por Perl y Virchow en el año 1871, siendo más frecuente en el sexo femenino, entre los 50-60 años de edad.⁽¹⁾ El leiomiosarcoma de vena cava inferior es el más común dentro de los tumores de grandes vasos, siendo un tumor maligno de origen mesenquimal originado a partir de la musculatura lisa de la túnica media.⁽²⁾ La cirugía constituye la principal opción terapéutica en estos pacientes, y debido a que son tumores de alto grado histológico a menudo se requiere del uso de radioterapia y quimioterapia sistémica, con beneficios limitados.⁽³⁾

Hasta la fecha se han reportado menos de 300-400 casos en la literatura internacional, y clásicamente se asocia a un crecimiento lento y progresivo, y con muy mal pronóstico, siendo el principal indicador pronóstico la cirugía radical con márgenes negativos.⁽²⁾⁽³⁾

Debido a la baja incidencia, la agresividad de la enfermedad y la dificultad en su abordaje terapéutico, comentamos el caso de una paciente portadora de leiomiosarcoma de vena cava inferior, en la cual se le realizó tratamiento resectivo e interposición de prótesis en vena cava.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso clínico de una paciente sexo femenino de 64 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, fibrilación auricular e hipotiroidismo que consulta por dolor a nivel lumbar derecho de meses de evolución. Presenta buen estado general, a nivel de fosa lumbar derecha se palpa una tumoración de aproximadamente 10 cm, poco móvil, dolorosa.

La tomografía computada (TC) evidencia una masa retroperitoneal de 86mm x 70mm x 102 mm, la cual envuelve la vena cava inferior (VCI), invade la grasa perirrenal y contacta con la pelvis renal (Figura 1), se complementa con Angiotomografía que confirma infiltración de la vena cava inferior.

Se realiza ecografía Doppler abdominal donde no evidencia trombosis en VCI, así como tampoco a nivel de vena porta.

Luego de realizados los estudios imagenológicos, se decide realizar punción guiada bajo TC, donde la citología informa leiomiosarcoma (LMS) de alto grado.

Discutido en comité de tumores, se decide realizar tratamiento quirúrgico, mediante la resección de la masa tumoral retroperitoneal.

Dicha masa en la exploración se originaba a nivel de la vena cava inferior e infiltraba macroscópicamente el riñón derecho, por lo que fue necesario realizar la resección de la vena cava inferior, por debajo de las venas renales y por encima de las venas ilíacas, logrando mar-

gen macroscópico sano, con interposición de prótesis y nefrectomía derecha asociada. (Figura 2)

Presenta buena evolución en el posoperatorio, iniciándose anticoagulación a las 12 hs del postoperatorio, inicialmente con heparina de bajo peso molecular, y luego con anticoagulantes orales, la cual se mantiene durante el primer año debido a que presenta área de trombosis con flujo conservado en la prótesis. (Figura 3)

La anatomía patológica de la pieza evidencia un leiomiosarcoma de alto grado; con borde de resección libre de tumor. Su inmunomarcación evidenció CkPan negativo, Vimentina positiva, S100 negativo, AM liso positivo, desmina positivo, Ki67 40%, CD34 negativo.

Se realiza el seguimiento en conjunto con equipo de oncología, el cual propuso tratamiento adyuvante mediante radioterapia, no presentando al año de la cirugía evidencia de recidiva loco regional ni diseminación a distancia.

DISCUSIÓN

Los leiomiosarcomas vasculares son neoplasias malignas raras que se originan en las fibras musculares lisas de la túnica media, constituyendo el 2% de los leiomiosarcomas, a su vez es sabido que es el tumor más frecuente que afecta la vena cava, y dentro de los tumores vasculares, el 60% abarca la vena cava.⁽⁴⁾

La clasificación más empleada descrita por Kulayat es por su localización, en la que se divide la vena cava en 3 sectores o segmentos. El segmento I (inferior) corresponde a VCI por debajo de las venas renales y se encuentra afectado en un 36% de los casos. El segmento II (medio) el cual se delimita desde las venas suprahepáticas hasta las venas renales, está involucrado en el 44% de los casos, de mejor pronóstico. El segmento III el cual se delimita desde la aurícula derecha hasta las venas suprahepáticas en 20% de los casos.⁽⁵⁾

Esta clasificación anatómica es también importante porque la variada forma de presentación clínica dependerá de la topografía donde asiente el tumor.⁽⁵⁾

La forma de presentación clínica muchas veces es asintomática, debido a su topografía retroperitoneal, en otras situaciones, la sintomatología suele ser muy inespecífica, existiendo dolor abdominal en flanco, palpación de tumor abdominal, edema de miembros inferiores, ascitis, ictericia, dependiendo fundamentalmente de la topografía.⁽⁶⁾

El diagnóstico requiere de la realización de estudios de imagen que aportan sobre la localización exacta del tumor y su relación con estructuras vecinas, muy importante a la hora de planificar la cirugía.⁽²⁾

La tomografía computada puede ayudar acerca del origen del tumor y su extensión, objetivándose como



Figura 1. TC de abdomen en fase portal. A) Imagen axial donde se observa masa retroperitoneal bien delimitada, con realce heterogéneo con el medio de contraste, presenta calcificaciones centrales. Engloba completamente la VCI. B) imagen en sagital donde se observa contacto con el riñón derecho, en C) imagen coronal donde se observa la extensión longitudinal del tumor y el compromiso de la VCI.




Figura 2. A) Fotografía quirúrgica que muestra el cargado de la VCI proximal y distal al tumor. B) Fotografía quirúrgica muestra el reemplazo de la VCI con prótesis de Dacrón C) Fotografía de la pieza de resección, incluye tumor, VCI, riñón derecho. D) Fotografía de la pieza de resección, incluye tumor abierto, VCI, riñón derecho.



Figura 3. TC de abdomen en fase portal, post operatorio. A) Imagen axial donde se observa remanente de VCI permeable de calibre conservado B) y C) reconstrucciones axiales y coronales que muestran prótesis interpuesta de VCI parcialmente trombosada con canal de flujo permeable.

una masa sólida, heterogénea, con áreas de necrosis, a su vez, la resonancia magnética puede aportar más información acerca de la extensión del tumor y la presencia de trombos.⁽⁷⁾

La punción biopsica guiada bajo imagen es necesaria para establecer y planificar un adecuado tratamiento.⁽²⁾⁽⁷⁾

La resección quirúrgica inicial agresiva sigue siendo la clave para la supervivencia a largo plazo en los leiomiosarcomas de vena cava inferior, la quimioterapia, así como la radioterapia, no han demostrado presentar mejores resultados que la cirugía en cuanto a sobrevida.⁽⁸⁾

La resección quirúrgica de la vena cava es un procedimiento poco frecuente, cuya indicación principal es la afectación tumoral de la misma, aunque se considera en estos casos que la enfermedad está avanzada, la resección puede mejorar la calidad de vida y sobrevida.⁽⁹⁾

Luego de la resección, las opciones terapéuticas pueden ser la ligadura completa de la vena cava inferior o la colocación de prótesis biológicas o sintéticas.⁽²⁾ Se han descrito también las resecciones parciales para tumores que afectan menos del 75% de la circunferencia de la vena cava y reconstrucción mediante cavoplastia con tejidos biológicos.⁽¹⁰⁾ En la reconstrucción de la vena cava inferior puede utilizarse vena autóloga o más comúnmente el uso de prótesis sintética, cuyo material puede ser de polietrafluoroetileno, Teflón o Dacron.⁽⁴⁾

La ligadura exclusiva de la vena cava inferior aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, aunque sin posibilidad de tromboembolismo pulmonar, mientras que la reconstrucción con prótesis tiene elevado riesgo de trombosis e infección.⁽²⁾ En tal sentido, se recomienda el uso de una prótesis de menor calibre que la vena, para de esta manera aumentar el flujo sanguíneo y disminuir el riesgo de trombosis.⁽⁷⁾

No hay consenso en cuanto a la necesidad de tratamiento anticoagulante o antiagregante tras la interposición de la prótesis. Algunos autores prefieren anticoagulación durante 6 meses seguida de antiagregación profiláctica, otros, la anticoagulación a largo plazo, como realizamos en nuestra paciente, mientras que otros refieren buenos resultados sin anticoagulación.⁽¹⁰⁾ Algunos autores incluso recomiendan realizar una fistula arteriovenosa inguinal para aumentar la velocidad del flujo y mejorar así la permeabilidad del injerto. Sin embargo, por el momento, no hay evidencia de que las fistulas arteriovenosas mejoren esta permeabilidad.⁽¹¹⁾

El papel del tratamiento neoadyuvante y adyuvante es controvertido. Kieffer et al consideran óptima la resección completa seguida de quimioterapia adyuvante para el tratamiento de tumores sin metástasis en el momento del diagnóstico.⁽¹¹⁾ Sin embargo, los informes de casos clínicos y pequeñas series retrospectivas de pacientes tratados con quimioterapia adyuvante después de la cirugía no han demostrado beneficios en términos de supervivencia o períodos libres de enfermedad.⁽¹⁰⁾ Las guías clínicas de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 2022 para sarcoma retroperitoneal/intraabdominal, establecen que la radioterapia neoadyuvante reduce el riesgo de siembra tumoral y hace que el tumor sea más susceptible a la resección. Sugiere en la cirugía dejar marcación con clips, a fin de guiar el tratamiento radioterápico adyuvante en caso de ser necesario. La adyuvancia con RT es discutida su indicación, se recomienda en pacientes con márgenes de

resección positivos, enfermedad de alto grado, tumores grandes, márgenes estrechos y algunos caos seleccionados.⁽¹⁰⁾

CONCLUSIÓN

Los LMS de la VCI aún representan un desafío para los cirujanos. La resección radical con márgenes negativos actualmente ofrece la mejor tasa de supervivencia. Aún se encuentra en discusión la indicación de la anticoagulación en pacientes con colocación de prótesis. Los tratamientos neoadyuvantes presentan indicaciones precisas y los mejores resultados se logran con un enfoque multidisciplinario.

ABSTRACT

Primary leiomyosarcoma of the vena cava is a very rare neoplasm that originates from the smooth muscle cells of the tunica media. It represents 2% of all the leiomyosarcomas and 60% of the vena cava tumors. We report a case of 64-year-old patient consulting for a lower right back pain. The computed tomography shows a large retroperitoneal mass which encompasses the inferior vena cava and involves of right kidney. The surgical treatment of tumor resection is performed with right nephrectomy and interposition of Dacron prosthesis. The anatomopathological study shows a high-grade leiomyosarcoma, not compromising the renal capsule, with resection free. Radical resection with negative margins currently offers the best survival rate. Anticoagulation treatment for patients with prosthesis placement is still under discussion.

RESUMO

O leiomiossarcoma primário da veia cava é uma neoplasia rara originada das células musculares lisas da tunica média. Representa 2% de todos os leiomiossarcomas e 60% dos tumores de veia cava. Apresentamos o caso clínico de um doente de 64 anos que consultou por lombalgia direita. A tomografia computadorizada revelou grande massa retroperitoneal que envolvia a veia cava inferior e contatava o rim direito; o estudo citológico da biópsia revelou um leiomiossarcoma.

O tratamento cirúrgico foi realizado por excisão tumoral e de veia cava inferior com interposição de prótese sintética e nefrectomia direita. O diagnóstico anatomo-patológico foi leiomiossarcoma de alto grau sem envolvimento da cápsula renal com bordas de ressecção livres de patologia.

A ressecção radical com margens negativas atualmente oferece a melhor taxa de sobrevida. A indicação de anticoagulação em pacientes com colocação de prótese ainda está em discussão.

Bibliografía:

- Lee HM, Jeong DS, Park PW, Kim WS, Sung K, Lee YT. Surgical treatment for an invasive leiomyosarcoma of the inferior vena cava. *Korean J Thorac Cardiovasc Surg* 2013;46(5):373-6. doi: 10.5090/kjcts.2013.46.5.373.
- Moreno-H A, Fernández-V L, López-B J, Pérez-D María. Tratamiento multidisciplinar del leimiosarcoma de vena cava Inferior Multidisciplinary treatment of leiomyosarcoma of inferior cava. *Rev Cir (Mex)* 2020; 72(1):72-5. doi: 10.35687/s2452-45492020001442.
- García M, Messa O, Ríos D, López H, Canedo J. Leiomiosarcoma de la vena cava inferior: reporte de un caso y revisión de la literatura. *Rev Colomb Cancerol* 2014; 18(1):41-5. doi: 10.1016/S0123-9015(14)70223-9.
- Guerrero MA, Cross CA, Lin PH, Keane TE, Lumsden AB. Inferior vena cava reconstruction using fresh inferior vena cava allograft following caval resection for leiomyosarcoma: midterm results. *J Vasc Surg* 2007; 46(1):140-3. doi:10.1016/j.jvs.2007.02.043.
- Spinelli A, Schumacher G, Benckert C, Sauer IM, Schmeding M, Glanemann M, et al. Surgical treatment of a leiomyosarcoma of the inferior vena cava involving the hepatic and renal veins confluences: technical aspects. *Eur J Surg Oncol* 2008; 34(7):831-5. doi: 10.1016/j.ejso.2007.01.015.
- Saikia J, Rastogi S, Barwad A, Dhamija E, Pandey R, Bhoriwal S, et al. A systematic review of the current management approaches in leiomyosarcoma of inferior vena cava-Results from analysis of 118 cases. *Asian Cardiovasc Thorac Ann* 2022; 30(3):349-63. doi: 10.1177/02184923211049911.
- Pérez-de-Villar JM, Arjona-Sánchez A, Rufián-Andujar B, Valenzuela-Molina F, Sánchez-Hidalgo JM, Rodríguez-Ortiz L, et al. Surgical treatment of vena cava leiomyosarcomas: series of cases in a referral center and literature review. *Cir Esp (Engl Ed)* 2022; 100(8):481-7. doi: 10.1016/j.cireng.2022.05.020.
- Quiñones-Baldrich WJ. Prosthetic replacement of the inferior vena cava. *Ann Vasc Surg* 1999; 13(4):449-56. doi: 10.1007/s100169900282.
- Manzanet G, Morón R, Suelves C, Calderón R, Corell R, Castell L, et al. Sustitución protésica de la vena cava inferior. Controversias actuales. *Cir Esp* 2005; 77(3): 170-2. doi: 10.1016/S0009-739X(05)70831-9.
- López-Ruiz JA, Tallón-Aguilar L, Marenco-de la Cuadra B, López-Pérez J, Oliva-Mompeán F, Padillo-Ruiz J. Leiomyosarcoma of the inferior vena cava. Case report and literature review. *Cir Cir (Engl Ed)*. 2017; 85(4): 361-5. doi: 10.1016/j.circen.2017.07.003.
- Kieffer E, Alaoui M, Piette JC, Cacoub P, Chiche L. Leiomyosarcoma of the inferior vena cava: experience in 22 cases. *Ann Surg* 2006; 244(2):289-5. doi: 10.1097/01.sla.0000229964.71743.db.

Contribución de autores y ORCID:

Alison Guillén y Nicolás Tarigo en concepción, diseño, ejecución, redacción. Mariana Zeoli y Federico Cabo en diseño y ejecución, Gustavo Andreoli y Roberto Valiñas en interpretación de los resultados, revisión crítica y análisis.

Alison Guillén, ORCID: 0000-0003-4399-7296
 Nicolás Tarigo, ORCID: 0000-0002-0807-5539
 Mariana Zeoli, ORCID: 0000-0002-7714-952X
 Federico Cabo, ORCID: 0000-0003-3771-5870
 Gustavo Andreoli, ORCID: 0000-0002-8717-1915
 Roberto Valiñas, ORCID: 0000-0001-7554-4537